



NAVODILO
**OSNOVNE SMERNICE
ZDRAVLJENJA S PSIHOFAKMI
V PB VOJNIK**

PBV – PBZS – NA: 011

Povezava: /

Izdaja: 1

Velja od: 1. 11. 2015

Stran: 1/1

NAMEN: Učinkovito in varno zdravljenje z zdravili.

1. Maksimalni terapevtski učinek poskušamo dosegati s čim manj zdravili v odmerkih, ki povzročajo čim manj neželenih učinkov.
2. Pri zdravljenju oseb starejših od 65 let in/ali kadar ima oseba predpisanih več kakor pet zdravil, vključimo v obravnavo kliničnega farmacevta.
3. Pri starostnikih odmerke počasi dvigujemo. Odmerki zdravil pri starostnikih naj bodo nižji oz. prilagojeni jetrni in ledvični funkciji.
4. Odmerki zdravil morajo biti znotraj dovoljenih maksimalnih dnevnih odmerkov.

ANTIPSIHOTIKI

5. Zdravilo predpisujemo na podlagi klinične slike in afinitete vezave zdravila na receptorje. Enako velja za kombinacije zdravil.
6. Pred uvedbo tretjega antipsihotika se posvetujemo s kliničnim farmacevtom.
7. Izogibamo se kombiniranju dveh zdravil s podobnim profilom delovanja.
8. Izogibamo se predpisovanju iste učinkovine v različnih tehnoloških oblikah (npr. kvetiapin + kvetiapin SR).
9. Kadar menjujemo zdravilo, sledimo priporočenim navodilom iz SmPC in/ali se posvetujemo s kliničnim farmacevtom.
10. Biperiden postopoma ukinjamo ob zniževanju odmerkov antipsihotika.
11. Pred uvedbo depo antipsihotika (Zypadhera, Xeplion, Risperdal consta, Abilify Maintena) na oddelku se posvetujemo s Komisijo za zdravila.

ANTIDEPRESIVI

12. Zdravilo predpisujemo na podlagi klinične slike in anamnestičnih podatkov.
13. Pred uvedbo drugega antidepressiva iz iste skupine, tretjega antidepressiva ali dveh kombiniranih antidepressivov, se posvetujemo s kliničnim farmacevtom.

STABILIZATORJI RAZPOLOŽENJA

14. Stabilizator predpisujemo pri bipolarni motnji, shizoafektivni motnji, ponavljajoči unipolarni depresiji in v primeru patološkega EEG, izjemoma tudi pri rezistentnih stanjih, po posvetu s kliničnim farmacevtom.
15. Po uvedbi stabilizatorja sledimo Priporočilom za uporabo in TDM specifičnih zdravil.

BENZODIAZEPINI

16. Benzodiazepine predpisujemo v akutni fazi bolezni, potem jih postopoma ukinjamo. Če je mogoče, jih popolnoma ukinemo do odpusta.

Pripravil: Vodja lekarne
Danila Hriberšek, mag. farm.,
spec. klin. farm

Pregledal: Strokovna direktorica
Metoda Vidmar Vengust,
dr. med., spec. psih.

Sprejel: Strokovna direktorica
Metoda Vidmar Vengust,
dr. med., spec. psih.

Dokumenti so obvladovani računalniško (preko strežnika). Na papir natisnjen dokument predstavlja kopijo. V primeru razlik med dokumenti se uporabi izvirni dokument (elektronska ali overjena pisna verzija), ki se nahaja na zbirniku oz. pri skrbniku dokumentov.

Natisnjeno 28. 11. 2024